

Codice Candidato

- 1) Secondo i principi della tecnica PNF (facilitazione neuromuscolare propriocettiva), per ottenere il massimo reclutamento possibile di unità motorie, quale resistenza deve essere applicata al movimento del paziente?
- A) Submassimale all'inizio del movimento B) Massimale durante tutto l'arco del movimento
- C) Massimale all'inizio del movimento D) Massimale alla fine del movimento
- 2) Chi, ai sensi dell'art. 8-quater comma 1 del D.lgs. 502/1992, provvede all'autorizzazione e all'accreditamento delle strutture pubbliche o private a fornire prestazioni per conto del SSN?
- A) Le Regioni B) Il Governo
- C) Il Presidente del consiglio dei Ministri D) Il Ministero della Salute
- 3) Quale fra le seguenti affermazioni riguardo all'uso di splint nell'artrite reumatoide è falsa?
- A) Gli splint correttivi, se efficaci, danno risultati entro 3 mesi B) Gli splint funzionali vengono utilizzati per facilitare il paziente nell'esecuzione di attività quotidiane
- C) Gli splint di riposo vengono utilizzati per proteggere le parti molli dalle trazioni dovute al processo morboso D) Gli splint di riposo vengono utilizzati per correggere la postura
- 4) Il bendaggio funzionale ha la caratteristica di:
- A) imporre un periodo di riposo forzato all'atleta B) immobilizzare tutta l'articolazione
- C) favorire il ritorno venoso D) proteggere le sole parti lese dell'articolazione, lasciando libertà motoria alle regioni attigue
- 5) Che cosa si intende con l'espressione "DAT"?
- A) Donazione anticipata di trattamento B) Disposizioni anticipate di trattamento
- C) Determinazione attiva al trattamento D) Deliberazione associata alla terapia
- 6) Il massaggio classico è controindicato in caso di:
- A) malattie reumatiche B) affezioni neurologiche
- C) patologie dell'apparato locomotore D) scompenso cardiocircolatorio
- 7) La sindrome di Guillain-Barrè:
- A) è una forma di fibromialgia B) è una malattia del primo motoneurone
- C) è una forma di neuropatia infiammatoria acquisita D) è una forma di osteopenia

Prove
8 luglio
21/3/2023



32
Prove
8 luglio
21/07/2023
F.lli

- 8) **Il distraction test valuta le articolazioni sacro-iliache attraverso:**
- A) una pressione dall'alto verso il basso esercitata sul sacro in posizione prona
 B) un movimento di abduzione massimale delle anche
 C) l'appoggio delle mani sulle creste iliache in carico monopodalico alternato
 D) una compressione verticale verso il basso delle spine iliache antero-superiori
- 9) **Quali tra le seguenti scale viene abitualmente utilizzata per la valutazione dei pazienti a domicilio?**
- A) Ashworth
 B) Six minutes walking test
 C) Tinetti
 D) Gait analysis
- 10) **Dopo quanto tempo viene normalmente concesso il carico totale con due canadesi in caso di protesi non cementata?**
- A) Dopo circa 2 mesi
 B) Dopo circa 3 mesi
 C) Dopo circa 20 giorni
 D) Dopo circa 1 mese
- 11) **Ai sensi dell'art. 22 comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, le cure domiciliari di livello base sono costituite:**
- A) da prestazioni professionali prevalentemente di tipo medico-infermieristico-assistenziale ovvero prevalentemente di tipo riabilitativo-assistenziale a favore di persone con patologie o condizioni funzionali che richiedono continuità assistenziale ed interventi programmati caratterizzati da un CIA compreso tra 0,14 e 0,30
 B) da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico e riabilitativo, accertamenti diagnostici, fornitura dei farmaci e dei dispositivi medici, nonché dei preparati per nutrizione artificiale a favore di persone con patologie che, presentando elevato livello di complessità, instabilità clinica e sintomi di difficile controllo, richiedendo continuità assistenziale ed interventi programmati caratterizzati da un CIA maggiore di 0,50
 C) da prestazioni professionali in risposta a bisogni sanitari di bassa complessità di tipo medico, infermieristico e/o riabilitativo, anche ripetuti nel tempo
 D) da prestazioni professionali prevalentemente di tipo medico-infermieristico-assistenziale ovvero prevalentemente di tipo riabilitativo-assistenziale a favore di persone con patologie o condizioni funzionali che richiedono continuità assistenziale ed interventi programmati caratterizzati da un CIA compreso tra 0,31 e 0,50
- 12) **Quale tra i seguenti segni non è comunemente associato al morbo di Parkinson?**
- A) Scialorrea
 B) Difficoltà di deglutizione
 C) Afasia
 D) Difficoltà di fonazione
- 13) **Ai sensi dell'art. 1 comma 10 lettera a) del D.lgs. 502/92, il Piano sanitario nazionale indica:**
- A) le condizioni di salute della popolazione presente sul territorio nazionale
 B) le aree prioritarie di intervento, anche ai fini di una progressiva riduzione delle disuguaglianze sociali e territoriali nei confronti della salute
 C) le risorse impiegate e le attività svolte dal Servizio sanitario nazionale
 D) i risultati conseguiti dalle regioni in riferimento all'attuazione dei piani sanitari regionali



B2N00401

- 14) **Quale fra le seguenti patologie è frequentemente caratterizzata da una sindrome respiratoria di tipo restrittivo?**
- A) La spondilite anchilosante
B) L'artrite reumatoide
C) La malattia di Alzheimer
D) La paraplegia
- 15) **Quale fra le seguenti non è un'indicazione all'uso della resistenza massimale nell'applicazione della metodica PNF (facilitazione neuromuscolare propriocettiva)?**
- A) Allenamento nello sportivo in preparazione a un evento significativo
B) Ipotrofia muscolare postimmobilizzazione a seguito di lesione ortopedica
C) Difficoltà di coordinazione motoria in soggetti con lesioni del sistema extrapiramidale
D) Emiplegia intermedia in base alla classificazione di André Albert
- 16) **Quale fra le seguenti posizioni è da sconsigliare al paziente operato con via d'accesso postero-laterale, perché favorisce la lussazione della protesi d'anca?**
- A) Adduzione, estensione, extrarotazione
B) Abduzione, flessione, intrarotazione
C) Abduzione, flessione, extrarotazione
D) Adduzione, flessione, intrarotazione
- 17) **Nei pazienti con esiti di trauma cranio-encefalico, lo "stato minimamente cosciente" prevede la capacità di:**
- A) avere attività verbale stereotipata ed eseguire un ordine motorio finalistico
B) fissare lo sguardo sul viso dell'interlocutore e chiudere gli occhi su comando verbale
C) seguire con lo sguardo uno stimolo visivo e avere attività motoria spontanea
D) eseguire movimenti riflessi e ruotare il capo verso la produzione di un suono
- 18) **Che cosa occorre fare per abduire gli arti inferiori estesi e incrociati di un bambino con grave spasticità in posizione supina?**
- A) Utilizzare una presa alle anche
B) Flettere gli arti inferiori
C) Utilizzare una presa alle ginocchia
D) Utilizzare una presa alle caviglie
- 19) **In merito ai concetti di autonomia e indipendenza, è corretto affermare che:**
- A) un paziente indipendente dal punto di vista motorio è anche autonomo
B) un paziente non può essere autonomo se è dipendente
C) una persona dipendente dal punto di vista motorio può anche essere autonoma
D) sono sinonimi
- 20) **Il muscolo tibiale anteriore è:**
- A) un elevatore del piede
B) un elevatore del primo dito
C) un elevatore del terzo e del quarto dito
D) un extrarotatore del piede
- 21) **Su cosa si basa l'uso a scopo terapeutico della laserterapia?**
- A) Sull'effetto piezoelettrico che scaturisce dall'emissione di raggi luminosi
B) Sui campi magnetici variabili a bassa intensità
C) Sull'effetto della corrente alternata che si ottiene sovrapponendo due monofasi in opposizione di fase tra loro
D) Sui raggi luminosi amplificati a seguito di emissione stimolata di radiazioni



B2N00401

- 22) **Tutte le seguenti affermazioni relative al bendaggio funzionale sono vere, tranne una. Quale?**
- A) In alcuni casi anche l'atleta è in grado di rinnovare il bendaggio funzionale
 B) Il bendaggio funzionale è rinnovabile in qualunque momento
 C) Il bendaggio funzionale è confezionato in misura standard
 D) Il bendaggio funzionale può essere utilizzato anche con calzature
- 23) **Quale nervo provvede all'innervazione del diaframma?**
- A) Il nervo subcostale
 B) Il nervo ricorrente
 C) Il nervo frenico
 D) Il nervo intercostale
- 24) **Quale delle seguenti affermazioni è corretta se riferita all'art. 8 del Codice Deontologico dei Fisioterapisti?**
- A) Il Fisioterapista, qualora lo ritenga necessario e indispensabile, può diffondere notizie sanitarie atte a suscitare illusioni o false aspettative
 B) Il Fisioterapista può utilizzare gli strumenti di informazione sia per scopi scientifici sia per scopi personali
 C) Il Fisioterapista non può utilizzare gli strumenti di informazione né per scopi personali né scientifici
 D) Il Fisioterapista impronta la propria comunicazione ai principi di evidenza, appropriatezza e sostenibilità
- 25) **Ai sensi dell'art. 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, quale delle seguenti affermazioni è errata?**
- A) Nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati
 B) In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente
 C) Il ricorso alla sedazione palliativa profonda continua o il rifiuto della stessa sono motivati e sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico
 D) Il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente, deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze, tranne in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato dal medico
- 26) **Si consideri il caso di un paziente a domicilio, politraumatizzato, con i seguenti esiti: frattura dell'arto inferiore sinistro (concesso carico sfiorato) e frattura dell'avambraccio destro (carico non autorizzato). La deambulazione:**
- A) può essere effettuata con deambulatore ascellare o stampelle sottoascellari
 B) può essere effettuata con walker
 C) può essere effettuata con due stampelle
 D) non può essere effettuata
- 27) **L'emipasso anteriore nella rieducazione propriocettiva delle lesioni ortopediche di ginocchio e caviglia proposta da Herveou e Messean è:**
- A) un esercizio in cui l'arto trattato è posto anteriormente rispetto a quello non trattato, indipendentemente dalla fase di oscillazione o di appoggio
 B) un esercizio in cui l'arto trattato è in fase di oscillazione anteriormente rispetto a quello non trattato, che è in fase di appoggio
 C) un esercizio in cui l'arto trattato è in fase di appoggio anteriormente su un gradino sopraelevato, rispetto a quello non trattato, che è in oscillazione
 D) un esercizio in cui l'arto trattato è in fase di oscillazione posteriormente rispetto a quello non trattato, che è in appoggio su un gradino sopraelevato



- 28) **Ai sensi dell'art. 5 della legge 833/1978, la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni in materia sanitaria, attinente a esigenze di carattere unitario, spetta:**
- A) alle regioni stesse e viene esercitata mediante un'apposita commissione
 B) allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei ministri
 C) al ministro della Salute esercitata mediante un'apposita commissione
 D) all'ANCI
- 29) **Quale delle seguenti è una delle funzioni della rotula?**
- A) Incrementare l'efficienza del muscolo Sartorio
 B) Incrementare l'efficienza del muscolo quadricipite
 C) Facilitare il movimento dei muscoli della zampa d'oca
 D) Proteggere il gomito
- 30) **Quando si interviene con la tecnica del bendaggio funzionale?**
- A) Una settimana dopo la lesione muscolare
 B) Due settimane dopo la lesione muscolare
 C) Solo quando viene consentita una graduale ripresa delle attività sportive
 D) Già nelle prime 24-48 ore dopo la lesione muscolare
- 31) **Il bendaggio funzionale:**
- A) viene applicato in direzione prossimo-distale
 B) viene applicato in direzione disto-proximale
 C) non può essere applicato se il paziente manifesta reazioni allergiche alla componente adesiva delle bende elastiche
 D) induce inibizione della propriocettività
- 32) **Gli osteofiti sono:**
- A) delle escrescenze che si formano a seguito di processi di degenerazione cronica delle ossa che compongono le articolazioni
 B) le cellule che compongono le ossa
 C) le cellule che compongono l'intima di un'arteria
 D) le cellule che compongono la sinovia
- 33) **Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.lgs. 502/1992, a chi spettano le funzioni amministrative in materia di assistenza ospedaliera?**
- A) Al Governo, in quanto sua esclusiva prerogativa
 B) Ai comuni
 C) Alle province
 D) Alle regioni
- 34) **La mobilitazione precoce di un paziente postinfartuato dev'essere momentaneamente sospesa qualora si verifichi:**
- A) aritmie, anche in assenza di sintomi emodinamici e disturbi soggettivi del paziente
 B) un incremento della frequenza cardiaca superiore a 20 battiti dopo l'esercizio
 C) un calo pressorio anche lieve nel passaggio dalla posizione supina a quella seduta
 D) un incremento della frequenza cardiaca fino a 10 battiti dopo l'esercizio



B2N00401

- 35) **Quale delle seguenti combinazioni di movimenti è propria della sinergia estensoria dell'arto inferiore?**
- A) Estensione d'anca e inversione della caviglia B) Estensione del ginocchio e flessione dorsale della caviglia
C) Abduzione ed extrarotazione dell'anca D) Flessione dell'anca e flessione del ginocchio
- 36) **In quale Titolo del Codice Deontologico dei Fisioterapisti viene fatto riferimento ai "Principi generali dell'esercizio professionale"?**
- A) Titolo III B) Titolo II
C) Titolo I D) Titolo IV
- 37) **Quale tipo di sensibilità si valuta muovendo passivamente l'arto di un paziente e chiedendogli in quale posizione si trova?**
- A) Cinestesica B) Batiestesica
C) Tattile superficiale D) Pressoria
- 38) **Quante sono le articolazioni del rachide?**
- A) 74 B) 46
C) 23 D) 10
- 39) **Lo sviluppo del processo scoliotico è:**
- A) massimo in età infantile e poi stabilizzato B) rapido ed evolutivo per tutta l'esistenza
C) lento ed evolutivo per tutta l'esistenza D) lento fino al picco puberale, rapido nel periodo di massima crescita e pressoché stabilizzato al termine della pubertà
- 40) **In ambito domiciliare, cosa bisognerebbe fare qualora durante un trattamento il paziente riferisse un dolore alto, rilevato tramite scala VAS?**
- A) Somministrare la scala VAS la seduta successiva B) Segnalare la cosa al MMG
C) Contattare il 112 D) Contattare l'infermiere di riferimento



B2N00401