

# **San Giuseppe Moscati**

Azienda Ospedaliera Di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione  
**UOC FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE E  
STERILITA' DI COPPIA**  
Direttore Dott. Cristofaro De Stefano

## **Informativa all'Esame di ISTEROSALPINGOGRAFIA**

La Isterosalpingografia a cui Lei verrà sottoposta su specifica richiesta del prescrittore, si effettua mediante introduzione di una sostanza radio-opaca (mezzo di contrasto) in utero, necessaria per visualizzare la cavità uterina e le tube e la successiva acquisizione di radiografie sul bacino.

Ha lo scopo di verificare la morfologia dell'utero e la pervietà delle salpingi in caso di infertilità o sterilità. L'introduzione del mezzo di contrasto iodato nella cavità uterina ed il suo passaggio in peritoneo o nel circolo sanguigno può in rari casi, determinare effetti secondari, di regola di lieve entità e di breve durata quali dolore addominali, bruciore o senso di pesantezza addominale. E' anche possibile, seppur molto raramente e senza che si possa prevederne la comparsa, l'insorgenza di disturbi più gravi (solo in via del tutto eccezionale pericolosi per la vita) per i quali Le saranno prestate immediate cure mediche. In alcuni casi la letteratura riporta problematiche alle tube non prevedibili e non motivate a priori (in letteratura si evidenzia un possibile danno tubarico fino dell' 1 % delle procedure).

La Isterosalpingografia può essere eseguita tra il 5° e il 12° giorno dall'inizio della mestruazione ed è necessario astenersi dai rapporti, dal primo giorno delle mestruazioni.

Al fine di prevenire eventuali forme di contaminazione peritoneale è opportuno documentare la assenza di patologie infiammatorie vaginali acute o croniche. **Per tale motivo è necessario eseguire prima dell'esame un tampone cervico-vaginale per la ricerca di germi n comuni, ureaplasma, mycoplasma e chlamydia che non risalga a più di tre mesi.**

Istruzioni riassuntive per l'esecuzione dell'esame

Alla richiesta :

- presentare il referto di un tampone cervico-vaginale compresa la ricerca di ureaplasma, mycoplasma e chlamydia
- presentare il referto di una ecografia pelvica transvaginale non antecedente a tre mesi eseguita per valutare l'anatomia dell'apparato genitale interno.

Al ritiro dei referti del tampone: Controllare i risultati insieme al proprio specialista ed accertarsi che siano **NEGATIVI**. Nel caso di positività, accordarsi con il proprio specialista per eseguire appropriata cura alla fine della quale **RIPETERE** il tampone relativo solo alla positività rilevata, fino a completa negativizzazione del tampone. Esempio: si ritira un tampone nel quale si rileva positività alla candida: eseguire terapia adeguata (in accordo con lo specialista) e alla fine della terapia, ripetere il tampone solo per la candida. NB: Se il proprio specialista fosse irreperibile, mostrare gli esami al proprio medico di base.

Il primo giorno della mestruazione Telefonare al numero \_\_\_\_\_ per prendere l'appuntamento solo dopo aver avuto il risultato negativo del tampone vaginale completo di mycoplasma e chlamydia. Non sarà possibile prenotare l'esame se il tampone vaginale ha anche una sola positività. - Astenersi dai rapporti sessuali dall'inizio della mestruazione fino all'esecuzione dell'esame (per escludere ogni possibile gravidanza in atto) e praticare Beta-HCG 2/3 gg prima dell'esame .

- Non avere eseguito una isteroscopia nei 7 giorni precedenti l'esame



Signora \_\_\_\_\_

### Preparazione isterosalpingografia/isterosonografia

- Effettuare tampone cervicale per ricerca germi comuni, Clamydia e Mycoplasmi
- Evitare di avere rapporti sin dalla mestruazione che precede l'esame

#### ISTEROSALPINGOGRAFIA

- Preparare impegnativa del medico di Medicina Generale con l'indicazione: **ISTEROSALPINGOGRAFIA**
- Chiamare il CUP ticket 0825 203905 per la prenotazione
- Chiamare la UOC Radiologia 0825 203242-203256 per informazioni

#### DUE GIORNI PRIMA DELL'ESAME:

- effettuare dosaggio beta-HCG su sangue ed esibirla al momento dell'esame.

#### LA SERA PRIMA DELL'ESAME:

- Praticare un clistere medicato, acquistabile in farmacia
- Praticare una lavanda vaginale: CLOREXIDINA 0.2%
- Assumere AZITROMICINA cps: due compresse insieme per via orale prima di andare a letto

#### LA MATTINA DELL'ESAME:

- Restare digiuna
- Ripetere la lavanda vaginale
- Venire in ospedale alle ore