



FORNITURA DI TEST CUTANEI ED EPICUTANEI A LETTURA RITARDATA (PATCH TEST) DA DESTINARE ALLA U.O.S.D. DERMATOLOGIA E DERMOCIRURGIA DELL'A.O.R.N. S.G. MOSCATI DI AVELLINO – AFFIDAMENTO DIRETTO

Allegato B – Caratteristiche Tecniche della Fornitura

SI RICHIEDE L'ACQUISTO, QUALE **FABBISOGNO ANNUALE**, DI:

- **N. 20 CONFEZIONI DI TEST CUTANEI ED EPICUTANEI A LETTURA RITARDATA PATCH TEST** (200 UNITA' TOTALI) COSTITUITI DA 3 PANNELLI DI CEROTTO CHIRURGICO, CIASCUNO CON 12 CELLE, 35 CELLE SONO RIVESTITE CON UN FILM CONTENENTE UNO SPECIFICO ALLERGENE O MISCELA DI ALLERGENI, UNA DELLE CELLE E' VUOTA.
ATC V04CL

LE MISCELE SONO COSI' SUDDIVISE:

PANNELLO 1. Solfato di nichel, Alcoli della Ianolina, Neomicina solfato, Bicromato di potassio, Profum, Colofonia, Cella vuota, Balsamo del Perù, Etilendiamina dicloridrato, Cloruro di cobalto.

PANNELLO 2. Resina-p-Terbutilfenolformaldeidica, Resina epossidica, Carba, Gomme, Metil(cloro)isotiazolinone, Quaternium, Metildibromoglutaronitrile, P-fenilendiammina, Formaldeidef, Mercapto mixg, Timerosal, Tiurami.

PANNELLO 3. Diazolidinil urea, Chinoline mixi, Tixocortolo-21-pivalato, Oro tiosolfato di sodi, Imidazolidinil urea, Budesonide, Idrocortisone-17-butirrato, Mercaptobenzotiazolo, Bacitracina 600, Partenolide Disperso blu, 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol (Bronopol).

Tali test vengono utilizzati ai fini diagnostici per identificare quelle sostanze che, una volta poste a contatto con la pelle, determinano una reazione infiammatoria locale.

Gli allergeni sono classificati come medicinale ai sensi del DL 219/06.